

Manual de Exames

Estudar a Vida. Essa é a nossa natureza.



Bem-vindo ao

Manual de Exames

da Ampligen Biotecnologia

Uma referência completa e prática para os profissionais atuando em clínicas e hospitais veterinários, zoológicos, centros de pesquisas e unidades de conservação.

Este manual abrange uma ampla gama de exames moleculares, oferecendo suporte diagnóstico confiável para diversas espécies, como cães, gatos, equinos, aves, animais selvagens e pet não convencionais.

Localizado em Maringá no Paraná, o Laboratório Ampligen Biotecnologia se destaca pelo uso de tecnologia de ponta, como a PCR em tempo real, garantindo diagnósticos precisos e ágeis.

Nossa equipe multidisciplinar é composta por médicos veterinários, biomédicos, biólogos e geneticistas, todos com especialização, mestrado e doutorado, proporcionando segurança e excelência em cada exame realizado.

Este manual foi elaborado para facilitar a rotina de profissionais comprometidos com o bem-estar animal, apresentando informações detalhadas sobre cada exame, os materiais de coleta necessários e os prazos de entrega dos resultados.

Na Ampligen, trabalhamos com inovação contínua e comprometimento com a saúde animal, oferecendo não apenas diagnósticos de alta precisão, mas também suporte técnico especializado para apoiar as decisões clínicas.



Atendemos todo o Brasil

Precisão e Agilidade em Exames Veterinários

A Ampligen oferece uma linha completa de exames laboratoriais voltados para a saúde de animais selvagens, exóticos e pets convencionais, com foco em análises moleculares.

Painéis de Exames por Espécies



Caninos



Felinos



Aves

Serviços Moleculares e Genéticos

- Exames Genéticos
- Exames Individuais de Biologia Molecular
- Extração e Sequenciamento de Ácidos Nucléicos

Pesquisa Científica

Serviços de Apoio à Pesquisa



Atendimento

Segunda a sexta-feira: 8h às 18h





Controle de **qualidade**

Na Ampligen, a qualidade é garantida por um sistema rigoroso de controle, tanto interno quanto externo:

- **Controle Interno de Qualidade (CIQ):**

Monitoramento contínuo do processo analítico de cada exame para garantir precisão nos diagnósticos.

- **Controle Externo de Qualidade (CEQ):**

Ensaios de proficiência trimestrais com análise externa, garantindo resultados confiáveis e imparciais.



Instruções para Coleta e Conservação de Amostras

A fase pré-analítica é crucial para garantir a qualidade dos resultados laboratoriais. Siga rigorosamente as instruções de preparo, coleta e transporte para evitar degradações que possam interferir nos exames moleculares.

Tipo de Amostra	Recipiente	Temperatura de armazenamento e envio	Prazo para envio	Instruções
 Sangue Total (EDTA)	Tubo EDTA (Tampa Roxa)	2° a 8°C	72 horas	Homogeneizar suavemente a amostra no tubo 10 vezes. Evitar movimentos bruscos.
 Plasma (EDTA)	Tubo EDTA (Tampa Roxa)	2° a 8°C	72 horas	Separar o plasma imediatamente após a coleta por centrifugação e manter refrigerado.
 Fezes Frescas	Coletor Universal Estéril (mínimo 5g)	2° a 8°C	72 horas	Coletar longe de solo e contaminantes. Enviar refrigerado.
 Swab Orofaríngeo, Retal, Nasal, Vaginal, Cloacal de Ambiente	Coletor Universal Estéril	Ambiente	72 horas	Coletar diretamente da mucosa e acondicionar corretamente.
 Urina	Coletor Universal Estéril	2° a 8°C	72 horas	Coletar com frasco estéril vedado e protegido da luz.
 Líquor	Coletor Universal Estéril	2° a 8°C	72 horas	Enviar o mais rápido possível após a coleta.
 Fragmento de Tecido	Coletor Universal Estéril	< -20°C	O mais rápido possível	Congelar imediatamente após a coleta e transportar em gelo.
 Penas	Kit Ampligen ou Coletor Universal Estéril	Ambiente	7 dias	Coletar 6 penas com bulbo e acondicionar imediatamente. Os bulbos não podem ter contato com nossas mãos e nem com fita adesiva.
 Sangue em Papel FTA	Papel FTA (mínimo 3 gotas)	Ambiente	7 dias	Utilizar 3 gotas de sangue e enviar protegido da luz.

Problemas Pré-Analíticos e Como Evitá-los

Problema **HEMÓLISE**

Como evitar:

No momento da coleta de sangue, é muito importante não puxar o êmbolo da seringa com muita força. Evitar também movimentos bruscos na fase de homogeneização da amostra recém coletada, assim como no transporte. Usar tubos com anticoagulantes adequados.

Problema **DEGRADAÇÃO DE RNA**

Como evitar:

Usar tubos com estabilizadores e refrigerar a amostra imediatamente após a coleta.

Problema **CONGELAMENTO INADEQUADO**

Como evitar:

Evitar congelar sangue total. Congelar apenas plasma/soro e evitar ciclos de congelamento.

Problema **CONTAMINAÇÃO CRUZADA**

Como evitar:

Realize a assepsia das mãos e utensílios acessórios. Utilize materiais estéreis de uso único para coleta e manuseio, evitando contato entre amostras.

Problema **IDENTIFICAÇÃO INCORRETA**

Como evitar:

Rotular adequadamente todas as amostras com informações completas do paciente.

Problema **VOLUME INSUFICIENTE**

Como evitar:

Certificar-se de coletar o volume mínimo necessário para o teste.

Problema **COLETA PRECOCE OU TARDIA**

Como evitar:

Coletar a amostra no momento adequado da infecção, seguindo a janela diagnóstica indicada.

Problema **JANELA VACINAL**

Como evitar:

Evitar realizar testes de PCR dentro de 2 semanas após a vacinação. Se possível, aguardar até 3 semanas para garantir que o material genético da vacina tenha sido eliminado do organismo, minimizando o risco de falsos positivos.



Coleta de **Urina**

A urina pode ser coletada por cistocentese (preferida), sondagem/cateterismo ou por micção espontânea/provocada. Utilize sempre uma seringa ou frasco estéril, devidamente vedado e protegido da luz. É crucial garantir uma assepsia rigorosa durante o procedimento.



Coleta de **Fezes**

A coleta deve ser realizada diretamente da ampola retal. Se a amostra for proveniente de defecação natural, priorize a coleta da parte superior das fezes, evitando o contato com o solo. Após a coleta, acondicionar em frasco estéril e manter refrigerado entre 2°C e 8°C por até 72 horas.

Quantidade ideal: Metade do frasco (coletor universal).

Quantidade mínima: 5 g



Coleta de **Sangue**

O sangue deve ser coletado em tubo apropriado, aguardando que o álcool utilizado na assepsia do acesso evapore completamente antes da punção. Evite forçar o êmbolo da seringa para não hemolisar a amostra.

Após a coleta, os tubos devem ser homogeneizados suavemente, girando-os por 10 vezes e manter refrigerado entre 2°C e 8°C por até 72 horas.

Painéis de Biologia Molecular para Caninos





CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
VCCAO	CHECK-UP PREVENTIVO CANINO ANAPLASMA PLATYS; BABESIA SPP.; BRUCELLA SPP.; CINOMOSE CANINA (CDV); EHRlichia SPP.; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
VPANC	PAINEL ANEMIA CANINO ANAPLASMA PLATYS; BABESIA SPP.; EHRlichia SPP.; LEISHMANIA SPP.; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; MYCOPLASMA HAEMOCANIS; RICKETTSIA RICKETTSII. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).
PC1	PAINEL CANÍDEOS I ANAPLASMA PLATYS; BABESIA SPP.; BRUCELLA SPP.; CINOMOSE CANINA (CDV); EHRlichia SPP.; LEISHMANIA SPP.; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).
PC3	PAINEL CANÍDEOS III BRUCELLA SPP.; CAMPYLOBACTER SPP.; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).
REPROC	PAINEL COBERTURA CANINO ADENOVÍRUS CANINO TIPO 1 (CAV-1); BRUCELLA SPP.; HERPESVÍRUS CANINO TIPO 1 (CHV-1); LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; MYCOPLASMA SPP.; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).
PDCB	PAINEL DIARRÉIA CANINO I CRYPTOSPORIDIUM SPP.; GIARDIA LAMBLIA; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G). AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
VPDCA	PAINEL DIARRÉIA CANINO II CAMPYLOBACTER SPP.; CINOMOSE CANINA (CDV); CLOSTRIDIUM SPP.; CORONAVÍRUS CANINO (CCoV); GIARDIA LAMBLIA; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
PHCB	PAINEL HEMATOLÓGICO CANINO I BABESIA SPP.; EHRlichia SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS). AMOSTRA SECUNDÁRIA: • CARRAPATO INTEIRO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTO DE TECIDO LINFÁTICO, FÍGADO OU BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
PHCP	PAINEL HEMATOLÓGICO CANINO II ANAPLASMA PLATYS; BABESIA SPP.; EHRlichia CANIS; EHRlichia SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS). AMOSTRA SECUNDÁRIA: • CARRAPATO INTEIRO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
VPHCA	PAINEL HEMATOLÓGICO CANINO III ANAPLASMA PLATYS; BABESIA SPP.; EHRlichia SPP.; LEISHMANIA SPP.; MYCOPLASMA HAEMOCANIS; RICKETTSIA RICKETTSII. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
VPNC	PAINEL NEUROPATIA CANINO I BORRELIA BURGDORFERI; CINOMOSE CANINA (CDV); CRYPTOCOCCUS SPP.; NEOSPORA CANINUM; TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) + SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
PNCA	PAINEL NEUROPATIA CANINO II CINOMOSE CANINA (CDV); CRYPTOCOCCUS SPP.; EHRlichia SPP.; HISTOPLASMA CAPSULATUM; NEOSPORA CANINUM; TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) + SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
VPIOC	PAINEL OFTALMOPATIA CANINO CINOMOSE CANINA (CDV); EHRlichia SPP.; HERPESVÍRUS CANINO TIPO 1 (CHV-1). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + SWAB CONJUNTIVAL OU CORNEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
REPROP	PAINEL REPRODUÇÃO CANINO ADENOVÍRUS CANINO TIPO 1 (CAV-1); BRUCELLA SPP.; CAMPYLOBACTER SPP.; HERPESVÍRUS CANINO TIPO 1 (CHV-1); LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; NEOSPORA CANINUM; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2); TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).
VPRCP	PAINEL RESPIRATÓRIO CANINO (COMPLEXO RESPIRATÓRIO) ADENOVIRUS CANINO 2 (CAV-2); BORDETELLA BRONCHISEPTICA; CINOMOSE CANINA (CDV); CORONAVÍRUS CANINO (CCoV); HERPESVÍRUS CANINO TIPO 1 (CHV-1); INFLUENZA A. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

SAUDE

PAINEL SAÚDE CANINA (DOENÇAS IMUNOSSUPRESSORAS)
ADENOVIRUS CANINO 2 (CAV-2); CINOMOSE CANINA (CDV); LEISHMANIA SPP.; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

PTCA

PAINEL TRIAGEM CANINO I
ANAPLASMA PLATYS; CORONAVÍRUS CANINO (CCoV); CINOMOSE CANINA (CDV); EHRLICHIA SPP.; MYCOPLASMA HAEMOCANIS; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2); LEISHMANIA SPP.; RICKETTSIA RICKETTSII.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

PTCAII

PAINEL TRIAGEM CANINO II
BABESIA SPP.; CINOMOSE CANINA (CDV); EHRLICHIA SPP.; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2); LEISHMANIA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

VPZC

PAINEL ZOONOSES CANINO
BRUCELLA SPP.; GIARDIA LAMBLIA; LEISHMANIA SPP.; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; RICKETTSIA RICKETTSII.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- + SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)
- + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).



Painéis de Biologia Molecular para Felinos



ampligen



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
VCFA	CHECK-UP PREVENTIVO FELINO CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; PARVOVÍRUS FELINO (FPV/ PANLEUCOPENIA FELINA); TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).
VPANF	PAINEL ANEMIA FELINO ANAPLASMA PLATYS; CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); CYTAUXZOOM SPP.; IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; MYCOPLASMA HAEMOFELIS. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).
CONJF	PAINEL CONJUNTIVITE FELINO CHLAMYDOPHILA FELIS; HERPESVÍRUS FELINO 1 (FHV-1); IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
DIARF	PAINEL DIARREIA FELINO CAMPYLOBACTER SPP.; CLOSTRIDIUM SPP.; CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); GIARDIA LAMBLIA; PARVOVÍRUS FELINO (FPV / PANLEUCOPENIA FELINA); TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).  AMOSTRA SECUNDÁRIA: • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
PFB	PAINEL FELINO I IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA VIRAL FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; MYCOPLASMA HAEMOFELIS). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  AMOSTRA SECUNDÁRIA: • FRAGMENTO DE LINFONODO OU BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
PBIO1	PAINEL HEMATOLÓGICO FELINO I IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; MYCOPLASMA HAEMOFELIS; MYCOPLASMA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML)  FRAGMENTO DE LINFONODO OU BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
HEMAF	PAINEL HEMATOLÓGICO FELINO II CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; MYCOPLASMA HAEMOFELIS. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
PIMF	PAINEL IMUNOSSUPRESSÃO VIRAL FELINO IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
VPNF	PAINEL NEUROPATIA FELINO CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); CRYPTOCOCCUS SPP.; IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; PARVOVÍRUS FELINO (FPV/PANLEUCOPENIA FELINA); TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
INTOCF	PAINEL OFTALMOPATIA FELINO BARTONELLA SPP.; CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); CRYPTOCOCCUS SPP.; HERPESVÍRUS FELINO 1 (FHV-1); IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: SWAB CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
REPROF	PAINEL REPRODUÇÃO FELINO CHLAMYDOPHILA FELIS; CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); HERPESVÍRUS FELINO 1 (FHV-1); IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; PARVOVÍRUS FELINO (FPV/ PANLEUCOPENIA FELINA); TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + SWAB VAGINAL OU PREPUCIAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
VCRF	PAINEL RESPIRATÓRIO FELINO BORDETELLA BRONCHISEPTICA; CALICIVÍRUS FELINO (FCV); CHLAMYDOPHILA FELIS; HERPESVÍRUS FELINO 1 (FHV-1); IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; MYCOPLASMA HAEMOFELIS. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
VPSFA	PAINEL SAÚDE FELINO I CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA VIRAL FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; PARVOVÍRUS FELINO (FPV/PANLEUCOPENIA FELINA); TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).
VPSFA2	PAINEL SAÚDE FELINO II CALICIVÍRUS FELINO (FCV); CHLAMYDOPHILA FELIS; IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEISHMANIA SPP.; LEUCEMIA VIRAL FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
PATF	PAINEL TRIAGEM FELINO ANAPLASMA PLATYS; BARTONELLA SPP.; BORDETELLA BRONCHISEPTICA; CALICIVÍRUS FELINO (FCV); CHLAMYDOPHILA FELIS; CINOMOSE CANINA (CDV); CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); CYTAUXZOOM SPP.; HERPESVÍRUS FELINO; IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEISHMANIA SPP.; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; LEUCEMIA VIRAL FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL; MYCOPLASMA HAEMOFELIS; PARVOVÍRUS FELINO (FPV/ PANLEUCOPENIA FELINA); RICKETTSIA RICKETTSII; TOXOPLASMA GONDII (TG); TRYPANOSOMA CRUZI (TC). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).
PFF	PAINEL VIRAL FELINO (PIF + FIV+ FELV) CORONAVÍRUS FELINO (FCoV); IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL; LEUCEMIA VIRAL FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g).
VPZF	PAINEL ZOONOSES FELINO BARTONELLA SPP.; GIARDIA LAMBLIA; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; RICKETTSIA RICKETTSII; TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g).

Painéis de Biologia Molecular para Aves





CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
BSD	BIRD SAFE DUO CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS; SEXAGEM DE AVES POR DNA. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
AVPT	CHECK-UP AVE PET CHLAMYDOPHILA PSITTACI; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).
CHKSEL	CHECK-UPAVES SELVAGENS ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); AVIPOXVÍRUS SPP (BOUBA AVIÁRIA; INFLUENZA A; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SPP.; MYCOPLASMA SYNOVIAE; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
VCAVC	CHECK-UP AVICULTURA / GALINHA CAIPIRA ASPERGILLUS FUMIGATUS; CANDIDA ALBICANS; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CRYPTOSPORIDIUM SPP.; EIMERIA SPP.; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA; SALMONELLA GALLINARUM; SALMONELLA PULLORUM; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
CALOPI	CHECK-UP CALOPSITAS I CHLAMYDOPHILA PSITTACI; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
CALOPII	CHECK-UP CALOPSITAS II ASPERGILLUS FUMIGATUS; BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CANDIDA ALBICANS; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
CASA	CHECK-UP DE VOLTA PARA CASA ASPERGILLUS FUMIGATUS; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

VPDPP

CHECK-UP DOENÇAS DAS PENAS I
ASPERGILLUS FUMIGATUS; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); GIARDIA LAMBLIA; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)



+ PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).

PDDRE

CHECK-UP DOENÇAS DAS PENAS II
CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV).

.PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PDDRE3

CHECK-UP DOENÇAS DAS PENAS III
CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); MYCOPLASMA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CHPIAC

CHECK-UP IMUNIDADE CANÁRIOS
ASPERGILLUS FUMIGATUS; CANDIDA ALBICANS; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS CANÁRIOS (CaCV); GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CHPAPA

CHECK-UP IMUNIDADE PASSERIFORMES
ASPERGILLUS FUMIGATUS; CANDIDA ALBICANS; EIMERIA SPP.; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SPP.; PASTEURILLA MULTOCIDA; SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CHPAPI

CHECK-UP IMUNIDADE PSITACÍDEOS
ASPERGILLUS FUMIGATUS; CANDIDA ALBICANS; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)



+ PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
CHMPA	CHECK-UP MEU PET AVES ASPERGILLUS FUMIGATUS; CANDIDA ALBICANS; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
CKPOVO	CHECK-UP OVO BRANCO CHLAMYDOPHILA PSITTACI; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).
VCPSC	CHECK-UP PREVENTIVO AVES ASPERGILLUS FUMIGATUS; CANDIDA ALBICANS; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CRYPTOSPORIDIUM SPP.; EIMERIA SPP.; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA; SALMONELLA GALLINARUM; SALMONELLA PULLORUM; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
VCCAN	CHECK-UP PREVENTIVO CANÁRIOS ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS CANÁRIOS (CaCV); CLOSTRIDIUM PERFRINGENS; EIMERIA SPP.; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA GALLINARUM; SALMONELLA PULLORUM; SALMONELLA SPP.; STAPHYLOCOCCUS AUREUS. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
CKGAL	CHECK-UP PREVENTIVO GALLIFORMES ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); VÍRUS DA ANEMIA INFECCIOSA DAS GALINHAS (CAV); AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CLOSTRIDIUM PERFRINGENS; EIMERIA SPP.; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA GALLINARUM; SALMONELLA PULLORUM; SALMONELLA SPP.; STAPHYLOCOCCUS AUREUS. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB DE LESÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

CHKP

CHECK-UP PREVENTIVO PASSERIFORMES
ASPERGILLUS FUMIGATUS; CANDIDA ALBICANS;
CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CLOSTRIDIUM PERFRINGENS; CRYPTOSPORIDIUM SPP.;
EIMERIA SPP.; ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGÊNICA; GIARDIA LAMBLIA;
ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA);
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA; SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CHKPO

CHECK-UP PREVENTIVO POMBOS
ADENOVÍRUS DOS POMBOS (PiAdV-1 / PiAdV-2) - PCR QUALITATIVO; ASCARIDIA SPP.;
AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA);
CAPILLARIA SPP.; CHLAMYDOPHILA PSITTACI;
CIRCOVÍRUS DOS POMBOS (PiCV); EIMERIA SPP.; HERPESVÍRUS DE COLUMBÍDEOS TIPO 1 (CoHV-1); HEXAMITA SPP.; ISOSPORA SPP.;
MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP.;
STREPTOCOCCUS GALLOLYTICUS;
VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CKPPS

CHECK-UP PREVENTIVO PSITACÍDEOS
ASPERGILLUS FUMIGATUS; BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI;
CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV);
EIMERIA SPP.; GIARDIA LAMBLIA;
HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA);
MYCOPLASMA SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV);
SALMONELLA PULLORUM; SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- 
 - + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).

CAVEC

CHECK-UP PREVENTIVO PREMIUM CANÁRIOS

INFECÇÕES VIRAIS:
ADENOVÍRUS TIPO 1; AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); CIRCOVÍRUS DOS CANÁRIOS (CaCV).

INFECÇÕES BACTERIANAS:
BORDETELLA AVIUM; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CLOSTRIDIUM SPP.; CLOSTRIDIUM PERFRINGENS; ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGÊNICA; MYCOPLASMA SPP.;
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE; SALMONELLA SPP.; SALMONELLA GALLINARUM; SALMONELLA PULLORUM; MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE; MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (COMPLEXO MCT); ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE (ORT); PASTEURELLA MULTOCIDA; STAPHYLOCOCCUS AUREUS.

INFECÇÕES FÚNGICAS:
ASPERGILLUS FUMIGATUS; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER; CANDIDA ALBICANS.

INFECÇÕES POR PROTOZOÁRIOS:
EIMERIA ACERVULINA; EIMERIA BRUNETTI; EIMERIA NECATRIX; EIMERIA TENELLA; EIMERIA MAXIMA; EIMERIA MITIS; EIMERIA PRAECOX; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; TOXOPLASMA GONDII (TG) ; CRYPTOSPORIDIUM SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- 
 - + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

CAVE

CHECK-UP PREVENTIVO PREMIUM
PASSERIFORMES

INFECÇÕES BACTERIANAS:
BORDETELLA AVIUM; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CLOSTRIDIUM PERFRINGENS; CLOSTRIDIUM SPP.; ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENICA; MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE; MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (COMPLEXO MCT); MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SPP.; MYCOPLASMA SYNOVIAE; ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE (ORT); PASTEURELLA MULTOCIDA; SALMONELLA GALLINARUM; SALMONELLA PULLORUM; SALMONELLA SPP.; STAPHYLOCOCCUS AUREUS.

INFECÇÕES VIRAIS:
ADENOVÍRUS TIPO 1.

INFECÇÕES FÚNGICAS:
ASPERGILLUS FUMIGATUS;
MACRORHABDUS ORNITHOGASTER;
CANDIDA ALBICANS.

INFECÇÕES POR PROTOZOÁRIOS:
EIMERIA ACERVULINA; EIMERIA BRUNETTI;
EIMERIA NECATRIX; EIMERIA TENELLA;
EIMERIA MAXIMA; EIMERIA MITIS; EIMERIA PRAECOX; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; TOXOPLASMA GONDII (TG) ;
CRYPTOSPORIDIUM SPP.; TRICHOMONAS SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)

+ SWAB OROFARÍNGEO(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CAVEP

CHECK-UP PREVENTIVO PREMIUM
PSITACÍDEOS

INFECÇÕES VIRAIS:
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1);
BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2);
POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV).

INFECÇÕES BACTERIANAS:
BORDETELLA AVIUM; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CLOSTRIDIUM PERFRINGENS; ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENICA; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP.; SALMONELLA GALLINARUM; SALMONELLA PULLORUM; MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE; MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (COMPLEXO MCT); ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE (ORT); PASTEURELLA MULTOCIDA; STAPHYLOCOCCUS AUREUS.

INFECÇÕES FÚNGICAS:
ASPERGILLUS FUMIGATUS;MACRORHABDUS ORNITHOGASTER; CANDIDA ALBICANS.

INFECÇÕES POR PROTOZOÁRIOS:
EIMERIA ACERVULINA; EIMERIA BRUNETTI;
EIMERIA NECATRIX; EIMERIA TENELLA;
EIMERIA MAXIMA; EIMERIA MITIS; EIMERIA PRAECOX; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; TOXOPLASMA GONDII (TG);
CRYPTOSPORIDIUM SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)

+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)



+ PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).





CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

CHPPRO

CHECK-UP PSITA-PRO
ASPERGILLUS FUMIGATUS; BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); EIMERIA SPP.; GIARDIA LAMBLIA; HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; PASTEURELLA MULTOCIDA; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP.; SALMONELLA PULLORUM.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- 
 - + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENASCOM BULBO).

CKQC

CHECK-UP QUARENTENA CANÁRIOS
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); CIRCOVÍRUS DOS CANÁRIOS (CaCV); CRYPTOSPORIDIUM SPP.; EIMERIA SPP.; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CKQE

CHECK-UP QUARENTENA EXÓTICOS
CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CRYPTOSPORIDIUM SPP.; EIMERIA SPP.; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; MYCOPLASMA SPP.; PARAMYXOVÍRUS SPP. (PMV); SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CKQPA

CHECK-UP QUARENTENA PASSERIFORMES
ASPERGILLUS FUMIGATUS; AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); CRYPTOSPORIDIUM SPP.; EIMERIA SPP.; GIARDIA LAMBLIA; ISOSPORA SPP.; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CKQPS

CHECK-UP QUARENTENA PSITACÍDEOS
ASPERGILLUS FUMIGATUS; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); EIMERIA SPP.; HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- 
 - + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
PAAN	PAINEL ARARINHA NA NATUREZA I ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); CRYPTOSPORIDIUM SPP.; EIMERIA SPP.; HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (COMPLEXO MCT); MYCOPLASMA SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PAAN2	PAINEL ARARINHA NA NATUREZA II ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); EIMERIA SPP.; HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); ISOSPORA SPP.; MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOBACTERIUM GENAVENSE; MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE; PARAMYXOVÍRUS SPP. (PMV); POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PAGPA	PAINEL AVIÁRIO GERAL PASSERIFORMES AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA PNEUMONIAE; MYCOPLASMA SPP.; MYCOPLASMA SYNOVIAE; SALMONELLA SPP.; TRICHOMONAS SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PAGP	PAINEL AVIÁRIO GERAL PSITACÍDEOS I CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PAPS	PAINEL AVIÁRIO GERAL PSITACÍDEOS II CANDIDA ALBICANS; ISOSPORA SPP.; STAPHYLOCOCCUS AUREUS. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB OROFARÍNGEO(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB DE LESÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

PAPSII

**PAINEL AVIÁRIO GERAL
PSITACÍDEOS III**
CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS
DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); MYCOPLASMA
SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- 
 - + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).

VCOCA

PAINEL COCCIDIOSES
CRYPTOSPORIDIUM SPP.; EIMERIA SPP.;
ISOSPORA SPP.; TOXOPLASMA GONDII (TG).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g);
- 
 - SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

PCRA1

PAINEL CRACÍDEOS I
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1);
ASPERGILLUS SPP.; INFLUENZA A;
MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP.;
VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PC2

PAINEL CRACÍDEOS II
ASPERGILLUS SPP.; CANDIDA SPP.;
CAPILLARIA SPP.; EIMERIA SPP.; INFLUENZA
A; MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOPLASMA
SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA;
SALMONELLA SPP.; TRICHOMONAS SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PCP1

PAINEL CRIADORES PSITACÍDEOS
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1);
BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV);
CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS
DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS
DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2);
MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM; POLIOMAVÍRUS
AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- 
 - + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

VPDA

PAINEL DIARREIA AVIÁRIA
CAMPYLOBACTER SPP.; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CLOSTRIDIUM PERFRINGENS; EIMERIA SPP.; E. COLI ENTEROPATOGÊNICA; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA; REOVÍRUS AVIÁRIO (ARV); SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PGA1

PAINEL GALLIFORMES I
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); ASPERGILLUS SPP.; INFLUENZA A; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA MELEAGRIDIS; MYCOPLASMA SYNOVIAE; SALMONELLA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PGA2

PAINEL GALLIFORMES II
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA).; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

VMIAV

PAINEL MICOPLASMOSES AVIÁRIAS
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRAS PRIMÁRIAS:**
 - SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - SWAB NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - SWAB CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - LÍQUIDO SINOVIAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,3 ML)
- 
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- 
 - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- **AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:**
 - FRAGMENTOS DE ÓRGÃO REPRODUTIVO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES)

PNAV

PAINEL NEUROLÓGICO AVIÁRIO
PASTEURELLA MULTOCIDA; BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); HERPESVÍRUS DE MAREK (HVT); PARAMYXOVÍRUS SPP. (PMV)

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRAS PRIMÁRIAS:**
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);
- 
 - FRAGMENTOS DE ÓRGÃOS: CORAÇÃO, FÍGADO, BAÇO, RINS, PROVENTRÍCULO, CÉREBRO, NÓDULOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
PRIES	PAINEL PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); INFLUENZA A; MYCOPLASMA SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PPETZ	PAINEL PETSHOP PSITACÍDEOS BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PPSI1	PAINEL PSITACÍDEOS I BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PPSI2	PAINEL PSITACÍDEOS II BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); MYCOPLASMA SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PR1	PAINEL RAMPHASTIDAE I ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); ASPERGILLUS SPP.; CANDIDA SPP.; CAPILLARIA SPP.; EIMERIA SPP.; INFLUENZA A; MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOBACTERIUM GENAVENSE; MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE; MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (COMPLEXO MCT) (COMPLEXO MCT); MYCOPLASMA MELEAGRIDIS; MYCOPLASMA SPP.; PASTEURILLA MULTOCIDA; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

PR2

PAINEL RAMPHASTIDAE II
ASPERGILLUS SPP.; CANDIDA SPP.;
CAPILLARIA SPP.; EIMERIA SPP.; INFLUENZA
A; MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOPLASMA
SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA;
SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PIZV

PAINEL RAPINANTES I
ASPERGILLUS FUMIGATUS;
CHLAMYDOPHILA PSITTACI; MYCOPLASMA
SPP.; SALMONELLA SPP.; TRICHOMONAS
SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PRAP2

PAINEL RAPINANTES II
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1);
AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA);
INFLUENZA A; MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE;
VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PRAP3

PAINEL RAPINANTES III
CAMPYLOBACTER SPP.; CHLAMYDOPHILA
PSITTACI; CRYPTOSPORIDIUM SPP.;
HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 /
PSHV-2); SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PRAPAIV

PAINEL RAPINANTES IV
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1);
ASPERGILLUS SPP.; AVIPOXVÍRUS SPP.
(BOUBA AVIÁRIA); BORNAVÍRUS AVIÁRIO
(ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI;
HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 /
PSHV-2); INFLUENZA A; MACRORHABDUS
ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA);
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM;
MYCOPLASMA SYNOVIAE; POLIOMAVÍRUS
AVIÁRIO (APV); CIRCOVÍRUS DOS
PSITACÍDEOS (PBFDV); SALMONELLA SPP.;
VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV);
TRICHOMONAS SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PRPIS

PAINEL REABILITAÇÃO PSITACÍDEOS I
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1);
BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA
PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS
(PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2
(PSHV-1 / PSHV-2); INFLUENZA A;
MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM; PARAMYXOVÍRUS SPP. (PMV);
POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA
SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- **AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)
- 
 - + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 
 - + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 
 - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)
- 
 - + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

PRPIS2

PAINEL REABILITAÇÃO PSITACÍDEOS II
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

VPREP

PAINEL REPRODUÇÃO AVIÁRIA
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

VPRA

PAINEL RESPIRATÓRIO AVIÁRIO I
ASPERGILLUS FUMIGATUS; BORDETELLA AVIUM; CHLAMYDOPHILA PSITTACI; MYCOPLASMA SPP.; ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE (ORT); PASTEURELLA MULTOCIDA.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

PDRAM

PAINEL RESPIRATÓRIO AVIÁRIO II
BRONQUITE INFECCIOSA AVIÁRIA; ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGÊNICA; GUMBORO (BIRNAVÍRUS - IBD); MYCOPLASMA GALISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE; PASTEURELLA MULTOCIDA; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV)

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

SGAPU

PAINEL SALMONELAS AVIÁRIAS
SALMONELLA GALLINARUM; SALMONELLA PULLORUM.

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)



+ PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO, COANA, CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTOS DE ÓRGÃOS: PULMÃO, SACOS AÉREOS, BAÇO, FÍGADO, INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)



+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SWAB OROFARÍNGEO, COANA, CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTOS DE ÓRGÃOS: PULMÃO, SACOS AÉREOS, BAÇO, FÍGADO, INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRA PRIMÁRIA:
• FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB CLOACAL COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• OVOS (SWAB DA CASCA OU DO CONTEÚDO).



AMOSTRA SECUNDÁRIA:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTOS DE TECIDO; FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
PSPAS	PAINEL SANITÁRIO PASSERIFORMES CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CLOSTRIDIUM PERFRINGENS; CRYPTOSPORIDIUM SPP.; ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGÊNICA; INFLUENZA A; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV); PASTEURELLA MULTOCIDA; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
PSAPS	PAINEL SANITÁRIO PSITACÍDEOS I ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); INFLUENZA A; MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOBACTERIUM GENAVENSE; MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE; MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (COMPLEXO MCT); MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PSAPSII	PAINEL SANITÁRIO PSITACÍDEOS II ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); INFLUENZA A; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOPLASMA SYNOVIAE; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV); POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PSA1	PAINEL SOLTURA AVES ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); ASPERGILLUS SPP.; AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); INFLUENZA A; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV); PAPILOMAVÍRUS SPP. (PV); POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP.; TRICHOMONAS SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
TECOLI	PAINEL TIPIIFICAÇÃO E. COLI EAEC (ESCHERICHIA COLI ENTEROAGREGATIVA) EIEC (ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASIVA) EPEC (ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGÊNICA) ETEC (ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXIGÊNICA) STEC (ESCHERICHIA COLI PRODUTORA DE TOXINA SHIGA). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS); • FRAGMENTOS DE ÓRGÃOS: SACOS AÉREOS, BAÇO, FÍGADO, INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • CULTURA BACTERIANA PARA IDENTIFICAÇÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
PATIR	PAINEL TIRANÍDEOS STAPHYLOCOCCUS AUREUS; STREPTOCOCCUS SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
PICI	PAINEL TRIAGEM PICIFORMES I AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); INFLUENZA A; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOBACTERIUM SPP.; SALMONELLA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
PTARA	PAINEL TRIAGEM ARARAS ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); CANDIDA SPP.; ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASIVA; ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGÊNICA; MYCOBACTERIUM AVIUM; MYCOBACTERIUM GENAVENSE; MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE; PARAMYXOVÍRUS SPP. (PMV). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
VPTAPB	PAINEL TRIAGEM AVE PET CHLAMYDOPHILA PSITTACI; MYCOPLASMA SPP.; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).
PTAEX	PAINEL TRIAGEM AVES EXÓTICAS INFLUENZA A; SALMONELLA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
PTAS	PAINEL TRIAGEM AVES SELVAGENS BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
VPIBA	PAINEL TRIAGEM IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); EIMERIA SPP.; HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); INFLUENZA A; ISOSPORA SPP.; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOPLASMA SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PICI	PAINEL TRIAGEM PICIFORMES I AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA); INFLUENZA A; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); MYCOBACTERIUM SPP.; SALMONELLA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
PTPIC	PAINEL TRIAGEM PICIFORMES II INFLUENZA A; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA MELEAGRIDIS; MYCOPLASMA SYNOVIAE; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
PTP1	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS I BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); MYCOPLASMA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PTP2	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS II BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); GIARDIA LAMBLIA; MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTÉRIA); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
PTP3	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS III ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); MYCOPLASMA SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PPESP	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS IV BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); INFLUENZA A; MYCOPLASMA PNEUMONIAE; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PTP5	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS V ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); MYCOBACTERIUM SPP.; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SPP.; POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV); SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PVPS2	PAINEL VIRAL PSITACÍDEOS II BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; HERPESVÍRUS DE MAREK (HVT); HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2); INFLUENZA A; MYCOPLASMA SPP.; PASTEURELLA MULTOCIDA; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV); POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  + PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).
PZOOA	PAINEL ZOOLÓGICO AVIÁRIO ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1); CHLAMYDOPHILA PSITTACI; INFLUENZA A; MYCOPLASMA GALLISEPTICUM; MYCOPLASMA SYNOVIAE; SALMONELLA SPP.; VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (NDV). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)  + SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA
--------	---------	---------

PZOOAII **PAINEL ZOOLOGICO AVIÁRIO II**
ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1);
CHLAMYDOPHILA PSITTACI; INFLUENZA A;
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM;
MYCOPLASMA MELEAGRIDIS; MYCOPLASMA
SYNOVIAE; VÍRUS DA DOENÇA DE
NEWCASTLE (NDV)

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

VPZAA **PAINEL ZONOSSES AVIÁRIAS**
ASPERGILLUS FUMIGATUS;
CHLAMYDOPHILA PSITTACI; GIARDIA
LAMBLIA; HISTOPLASMA CAPSULATUM;
MYCOBACTERIUM SPP.; SALMONELLA SPP.;
TOXOPLASMA GONDII (TG).

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)
- 

+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 

+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 

+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 

OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

- 
 - AMOSTRA PRIMÁRIA:**
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g)
- 

+ SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 

+ SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)
- 

+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML)
- 

OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

Painéis de Biologia Molecular para Animais Exóticos, Selvagens e de Zoológico




ampligen

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
CKPR	CHECK-UP PREVENTIVO RÉPTEIS ASPERGILLUS FUMIGATUS; CLOSTRIDIUM SPP; CRYPTOSPORIDIUM SPP; ENTAMOEBA; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP; MYCOBACTERIUM SPP; MYCOPLASMA SPP; PARAMYXOVIRUS OFÍDICO; REOVIRUS; SALMONELLA SPP; TOXOPLASMA GONDII (TG) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB ORAL, CLOACAL OU NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS). AMOSTRA SECUNDÁRIA: • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS, BAÇO, PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB DE LESÕES CUTÂNEAS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) ;  • LÍQUIDO CAVITÁRIO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	RÉPTEIS
CLOS3	PAINEL C. ESTERTHETICUM + C. GASIGENES CLOSTRIDIUM ESTERTHETICUM; CLOSTRIDIUM GASIGENES. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • CONTEÚDO GASTROINTESTINAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • CONTEÚDO RUMINAL OU ESTOMACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G). AMOSTRA SECUNDÁRIA: • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO,RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);	AVES DE PRODUÇÃO; BOVINOS; EQUINOS; PRIMATAS; RÉPTEIS; SUÍNOS; PEQUENOS MAMÍFEROS.
PHE	PAINEL HEMOPARASITAS EQUINO ANAPLASMA PLATYS; BABESIA SPP; EHRlichia SPP; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP; THEILERIA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	EQUINOS
LMSAL	PAINEL L. MONOCYTOGENES + SALMONELLA SPP. LISTERIA MONOCYTOGENES; SALMONELLA SPP. PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS). AMOSTRA SECUNDÁRIA: • SWAB DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES PET; AVES DE PRODUÇÃO; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; RÉPTEIS; SUÍNOS.
PPRES	PAINEL PRIMATAS I LEISHMANIA SPP.; PAPILOMAVIRUS; PLASMODIUM SPP.; ROTAVÍRUS A (RV-A); TOXOPLASMA GONDII (TG) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	PRIMATAS

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
PP2	PAINEL PRIMATAS II HERPES SIMPLEX 1 E 2 (HSV-1 / HSV-2); LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; LEISHMANIA SPP.; MYCOBACTERIUM SPP.; PLASMODIUM SPP.; ROTAVÍRUS A (RV-A); TOXOPLASMA GONDII (TG) ; TRYPANOSOMA CRUZI (TC).	  	PRIMATAS
	PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	
PP3	PAINEL PRIMATAS III HEPATITE B (HBV); HEPATITE C (HCV); HERPES SIMPLEX 1 E 2 (HSV-1 / HSV-2); LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; TOXOPLASMA GONDII (TG).	  	PRIMATAS
	PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	
PP4	PAINEL PRIMATAS IV LEISHMANIA SPP.; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP.; TOXOPLASMA GONDII (TG).	  	PRIMATAS
	PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	
PP5	PAINEL PRIMATAS V HEPATITE B (HBV); HEPATITE C (HCV); HERPES SIMPLEX 1 E 2 (HSV-1 / HSV-2); SALMONELLA SPP.	   	PRIMATAS
	PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL OU PLASMA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) OU SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	
PRESE	PAINEL RESPIRATÓRIO EQUINO ASPERGILLUS FUMIGATUS; BORDETELLA BRONCHISEPTICA; INFLUENZA A; MYCOPLASMA SPP.; STREPTOCOCCUS SPP.	    	EQUINOS
	PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • LAVADO TRAQUEAL OU BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • SWAB NASAL COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL; + SWAB CONJUNTIVAL COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL; • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); + SWAB CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	
PSERP	PAINEL SERPENTES I MYCOPLASMA SPP.; PARAMYXOVÍRUS SPP. (PMV); SALMONELLA SPP.	   	SERPENTES
	PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	
PFER1	PAINEL TRIAGEM FERRETS I CINOMOSE CANINA (CDV); INFLUENZA A; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP; MYCOBACTERIUM SPP; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2).	    	FERRETS
	PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) + SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	
PTGM	PAINEL TRIAGEM GRANDES MAMÍFEROS I ADENOVIRUS CANINO 1 (CAV-1); BRUCELLA SPP.; PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2).	   	GRANDES MAMÍFEROS
	PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRA PRIMÁRIA: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS) + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML) + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
PTGMII	PAINEL TRIAGEM GRANDES MAMÍFEROS II ANAPLASMA PLATYS; BABESIA SPP; MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (COMPLEXO MCT). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	GRANDES MAMÍFEROS
PGPA	PAINEL TRIAGEM PEQUENOS MAMÍFEROS I CRYPTOSPORIDIUM SPP; EIMERIA SPP; GIARDIA LAMBRIA; ISOSPORA SPP; TOXOPLASMA GONDII (TG) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	PEQUENOS MAMÍFEROS
PTPM	PAINEL TRIAGEM PEQUENOS MAMÍFEROS II CINOMOSE CANINA (CDV); PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	PEQUENOS MAMÍFEROS
PTRO	PAINEL TRIAGEM ROEDORES RICKETTSIA RICKETTSII; TRYPANOSOMA CRUZI (TC) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  AMOSTRA SECUNDÁRIA: • FRAGMENTO DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO, LINFONODOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	ROEDORES
VPZPA	PAINEL ZONÓSES PRIMATAS HERPES SIMPLEX 1 E 2 (HSV-1 / HSV-2); LEISHMANIA SPP; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP; MYCOBACTERIUM SPP; SALMONELLA SPP; TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	PRIMATAS
PZREP	PAINEL ZONÓSES RÉPTEIS ASPERGILLUS FUMIGATUS; CRYPTOSPORIDIUM SPP; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP; MYCOBACTERIUM SPP; RICKETTSIA RICKETTSII; TOXOPLASMA GONDII (TG). PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	RÉPTEIS
VPZR	PAINEL ZONÓSES ROEDORES BORRELIA BURGDORFERI; LEISHMANIA SPP; LEPTOSPIRA PATOGÊNICA SPP; RICKETTSIA RICKETTSII; SALMONELLA SPP; TOXOPLASMA GONDII (TG) PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  + URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  + FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	ROEDORES

**Exames
genéticos**

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
PMAC	ARARA - CANINDÉ (ARA ARARAUNA), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PAC	ARARA - CANINDÉ (ARA ARARAUNA), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
SGAC	ARARA - CANINDÉ (ARA ARARAUNA), SIMILARIDADE GENÉTICA PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
RGAC	ARARA CANINDÉ (ARA ARARAUNA), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
SEXINT	AVIAN DNA SEXING PRAZO: 2 DIAS ÚTEIS	AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA, KIT AMPLIGEN (MÍNIMO 1 GOTAS);  • PENAS COM BULBO (MÍNIMO 6, PREFERENCIAL MENTE DA REGIÃO DA CLOACA); • CASCA DO OVO (GARANTIR QUE A MEMBRANA INTERNA ESTEJA PRESENTE).	AVES DE REPRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS;
RGAZUL	AZULÃO (CYANOLOXI [PASSERINA] BRISSONI), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
BETAC	BETA CASEÍNA, IDENTIFICAÇÃO DO GENÓTIPO A2/A2 PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • PELO COM RAIZ (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 25 FOLÍCULOS COM BULBOS INTACTOS).	BOVINOS
PMBI	BICUDO (SPOROPHILA MAXIMILIANI), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

PPB	BICUDO (SPOROPHILA MAXIMILIANI), PROBABILIDADE DE PARENTESCO PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PBI	BICUDO (SPOROPHILA MAXIMILIANI), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
VRG	BICUDO (SPOROPHILA MAXIMILIANI), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
SGB	BICUDO (SPOROPHILA MAXIMILIANI), SIMILARIDADE GENÉTICA PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PMCT	CANÁRIO - DA -TERRA (SICALIS FLAVEOLA), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PPCT	CANÁRIO - DA - TERRA (SICALIS FLAVEOLA), PROBABILIDADE DE PARENTESCO PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PCT	CANÁRIO - DA -TERRA (SICALIS FLAVEOLA), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
SGCT	CANÁRIO - DA -TERRA (SICALIS FLAVEOLA), SIMILARIDADE GENÉTICA PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
RGCANA	CANÁRIO-DA-TERRA (SICALIS FLAVEOLA), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
PMCB	COLEIRO BAIANO (SPOROPHILA NIGRICOLLIS), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
PPCB	COLEIRO BAIANO (SPOROPHILA NIGRICOLLIS), PROBABILIDADE DE PARENTESCO PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PCB	COLEIRO BAIANO (SPOROPHILA NIGRICOLLIS), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
RGCB	COLEIRO BAIANO (SPOROPHILA NIGRICOLLIS), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
PMC	COLEIRO PAPA CAPIM (SPOROPHILA CAERULESCENS), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PPCC	COLEIRO PAPA CAPIM (SPOROPHILA CAERULESCENS), PROBABILIDADE DE PARENTESCO PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PC	COLEIRO PAPA CAPIM (SPOROPHILA CAERULESCENS), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
SGCB	COLEIRO PAPA CAPIM (SPOROPHILA CAERULESCENS), SIMILARIDADE GENÉTICA PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
RGCP	COLEIRO PAPA-CAPIM (SPOROPHILA CAERULESCENS), RG - REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
PMCO	CURIÓ (SPOROPHILA ANGOLENSIS), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PPCO	CURIÓ (SPOROPHILA ANGOLENSIS), PROBABILIDADE DE PARENTESCO PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
PCO	CURIÓ (SPOROPHILA ANGOLENSIS), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
RGC	CURIÓ (SPOROPHILA ANGOLENSIS), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
SGCO	CURIÓ (SPOROPHILA ANGOLENSIS), SIMILARIDADE GENÉTICA PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
EGP	ESTRUTURA GENÉTICA DO PLANTEL PRAZO: 15 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PMGI	GALO ÍNDIO GIGANTE (GALLUS GALLUS), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES DE PRODUÇÃO
PPGI	GALO ÍNDIO GIGANTE (GALLUS GALLUS), PROBABILIDADE DE PARENTESCO PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES DE PRODUÇÃO
PGIG	GALO ÍNDIO GIGANTE (GALLUS GALLUS), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES DE PRODUÇÃO
RGGAL	GALO ÍNDIO GIGANTE (GALLUS GALLUS), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
SGGI	GALO ÍNDIO GIGANTE (GALLUS GALLUS), SIMILARIDADE GENÉTICA PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
RGHAR	HARPIA (HARPIA HARPYJA), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

RGMUT	MUTUM-DE-PENACHO (CRAX FASCIOLATA), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
-------	---	--	----------

PMPV	PAPAGAIO VERDADEIRO (AMAZONA AESTIVA), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
------	--	---	----------

PPPV	PAPAGAIO VERDADEIRO (AMAZONA AESTIVA), PROBABILIDADE DE PARENTESCO PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
------	---	---	----------

PPV	PAPAGAIO VERDADEIRO (AMAZONA AESTIVA), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
-----	---	---	----------

ARGPS	PAPAGAIO VERDADEIRO (AMAZONA AESTIVA), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS).	AVES PET
-------	--	--	----------

SGPV	PAPAGAIO VERDADEIRO (AMAZONA AESTIVA), SIMILARIDADE GENÉTICA PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
------	---	---	----------

VRGC	PATERNIDADE CANINA, PERFIL GENÉTICO INDIVIDUAL PRAZO: 30 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS);  • SWAB BUCAL (COLETOR UNIVERSAL).	CÃES
------	--	--	------

RIMP	PKD-1 FELINO, POLIMORFISMO NO GENE (RIM POLICÍSTICO) – GENOTIPAGEM PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • SWAB BUCAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	GATOS
------	---	--	-------

PPPOM	POMBOS CORREIO, PERFORMANCE (GENES LDHA, DRD4-1, DRD4-2), GENOTIPAGEM PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS);  • PENAS COM BULBO (MÍNIMO 6, PREFERENCIAL MENTE DA REGIÃO DA CLOACA).	AVES PET
-------	--	--	----------

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
SEXAF	SEXAGE DES OISEAUX PAR L'ADN PRAZO: 2 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA, KIT AMPLIGEN (MÍNIMO 1 GOTAS)  • PENAS COM BULBO (MÍNIMO 6, PREFERENCIAL MENTE DA REGIÃO DA CLOACA) • CASCA DO OVO (GARANTIR QUE A MEMBRANA INTERNA ESTEJA PRESENTE).	AVES DE PRODUÇÃO AVES PET AVES SELVAGENS
SEXLOG	SEXAGEM DE AVES POR DNA PRAZO: 2 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA, KIT AMPLIGEN (MÍNIMO 1 GOTAS)  • PENAS COM BULBO (MÍNIMO 6, PREFERENCIAL MENTE DA REGIÃO DA CLOACA). • CASCA DO OVO (GARANTIR QUE A MEMBRANA INTERNA ESTEJA PRESENTE).	AVES DE PRODUÇÃO AVES PET AVES SELVAGENS
SEXAC	SEXAGEM DE AVES POR DNA COM ANILHA PARA CALOPSITAS PRAZO: 2 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA, KIT AMPLIGEN (MÍNIMO 1 GOTAS)  • PENAS COM BULBO (MÍNIMO 6, PREFERENCIAL MENTE DA REGIÃO DA CLOACA) • CASCA DO OVO (GARANTIR QUE A MEMBRANA INTERNA ESTEJA PRESENTE).	AVES PET
SEXB	SEXAGEM GENÉTICA BOVINA PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  • PELOS COM BULBO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  • FRAGMENTOS DE TECIDO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	BOVINOS
SEXAE	SEXAJE POR ADN PRAZO: 2 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA, KIT AMPLIGEN (MÍNIMO 1 GOTAS)  • PENAS COM BULBO (MÍNIMO 6, PREFERENCIAL MENTE DA REGIÃO DA CLOACA) • CASCA DO OVO (GARANTIR QUE A MEMBRANA INTERNA ESTEJA PRESENTE).	AVES DE PRODUÇÃO AVES PET AVES SELVAGENS
MTOB	TOBIANA MUTAÇÃO, GENOTIPAGEM PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  • PELOS COM BULBO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	EQUINOS
PMTF	TRINCA - FERRO (SALTATOR SIMILIS), PATERNIDADE OU MATERNIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	 • REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
PPTF	TRINCA - FERRO (SALTATOR SIMILIS), PROBABILIDADE DE PARENTESCO PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	 • REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
PTF	TRINCA - FERRO (SALTATOR SIMILIS), PROVA DE IDENTIDADE DE AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
SGTF	TRINCA - FERRO (SALTATOR SIMILIS), SIMILARIDADE GENÉTICA PARA AVES PRAZO: 6 DIAS ÚTEIS	REGISTRO DE DADOS DAS AVES ENVOLVIDAS JÁ ANALISADOS PELO LABORATÓRIO AMPLIGEN (RG – REGISTRO GENÉTICO).	AVES PET
ARGT	TRINCA-FERRO (SALTATOR SIMILIS), RG – REGISTRO GENÉTICO, GENOTIPAGEM PRAZO: 45 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 2 GOTAS). AMOSTRAS PRIMÁRIAS:	AVES PET



Biologia Molecular - Exames individuais

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
ADEAV	ADENOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1 (AAV-1) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • LAVADO TRAQUEAL OU FARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML) • OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTO DE TECIDO: FÍGADO OU BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS.
CAV1	ADENOVÍRUS CANINO TIPO 1 (CAV-1) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTO HEPÁTICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	CÃES; GRANDES MAMÍFEROS; (CANÍDEOS SELVAGENS, COMO RAPOSAS).
CAV2	ADENOVÍRUS CANINO TIPO 2 (CAV-2) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • LAVADO BRÔNCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML).	CÃES
ADPOM	ADENOVÍRUS DOS POMBOS (PiAdV-1 / PiAdV-2) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • FRAGMENTO HEPÁTICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES PET; AVES SELVAGENS.
AERO	AEROMONAS SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTO DE TECIDO INFECTADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • ÁGUA OU LODO DE AMBIENTE CONTAMINADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 ML);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML).	ANFÍBIOS; CÃES; GATOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEIXES DE AQUÁRIO; PEQUENOS MAMÍFEROS; RÉPTEIS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
ANAP	ANAPLASMA PLATYS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML). • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML); • FRAGMENTO DE BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	CÃES; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS (CANÍDEOS).
AIGPC	ANEMIA INFECCIOSA DAS GALINHAS (CAV), VÍRUS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML); • FRAGMENTO HEPÁTICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • FRAGMENTO DA MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML). • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO
ASCA	ASCARÍDIA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G); • SWAB CLOACAL OU RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL). • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • CONTEÚDO GASTROINTESTINAL (LAVADO ESTOMACAL OU INTESTINAL, COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • FRAGMENTO DE INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SOLO SOB AS ÁREAS AFETADAS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS.
ASPE	ASPERGILLUS FUMIGATUS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • LAVADO TRAQUEAL OU BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL). • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTO PULMONAR OU SACOS AÉREOS PARA AVES (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML); • FRAGMENTO DE TECIDO DE LESÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; GRANDES FELINOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; SUÍNOS.
VASP	ASPERGILLUS SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML). • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • FRAGMENTO DE PULMÃO OU SACOS AÉREOS PARA AVES (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; RÉPTEIS; SUÍNOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
VATOX	ATOXOPLASMA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB DE CLOACA OU SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTO DE FÍGADO, BAÇO OU INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS.
AVBP	AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB TRAQUEAL OU NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML);  • SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS.
VAVIP	AVIPOXVÍRUS SPP. (BOUBA AVIÁRIA) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • RASPADO OU SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTO DE PELE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTO DE MUCOSA ORAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS.
BABE	BABESIA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTO DE BAÇO OU FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • RASPADO DE MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML);  • CARRAPATO INTEIRO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; SUÍNOS.
BART	BARTONELLA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTO DE TECIDO: LINFONODOS OU BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	CÃES; GATOS; GRANDES FELINOS; GRANDES MAMÍFEROS; PRIMATAS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

BORAV

BORDETELLA AVIUM -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• LAVADO TRAQUEAL OU BRONCOALVEOL AR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, TRAQUEIA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

BORD

BORDETELLA
BRONCHISEPTICA - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• LAVADO TRAQUEAL OU BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,2 ML).

CÃES;
GATOS;
GRANDES FELINOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS.

VBORNA

BORNAVÍRUS AVIÁRIO
(ABV) - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• LAVADO TRAQUEAL OU BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FRAGMENTO DE TECIDO: NERVOSO, PROVENTRÍCULO, RINS, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
AVES DE PRODUÇÃO;
AVES SELVAGENS.

LYME

BORRELIA
BURGDORFERI - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• LÍQUIDO SINOVIAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FRAGMENTO DE TECIDO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• CARRAPATO INTEIRO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
GATOS;
EQUINOS;
PRIMATAS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
GRANDES MAMÍFEROS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

VBI

BRONQUITE INFECCIOSA AVIÁRIA (IBV), VÍRUS - RT-PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• LAVADO TRAQUEAL OU BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTO DE TECIDO: PULMÃO, TRAQUÉIA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

BRUCP

BRUCELLA SPP. - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTO DE TECIDO: LINFODOS, FÍGADO, BAÇO, PLACENTA OU TECIDOS REPRODUTIVOS, TESTÍCULOS E EPIDÍDIMO, RIM (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SECREÇÃO VAGINAL OU LOQUIOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• LEITE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).

BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
SUÍNOS.

CALIC

CALICIVÍRUS FELINO (FCV), VÍRUS - RT-PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• LAVADO TRAQUEAL OU BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, TRAQUEIA, BRÔNQUIOS, ORAL OU LINGUAL, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

GATOS;
GRANDES FELINOS.

CAMPYJ

CAMPYLOBACTER JEJUNI - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, LINFONODOS MESENTÉRICOS, TECIDO CLOACAL EM AVES (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
GATOS;
GRANDES;
MAMÍFEROS PEQUENOS;
MAMÍFEROS PRIMATAS;
SUÍNOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

CAMSP

CAMPYLOBACTER SPP. -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);
- 
 - SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:**
 - SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- 

OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);
- 
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, LINFONODOS MESENTÉRICOS, TECIDO CLOACAL EM AVES (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
SUÍNOS.

VCANDA

CANDIDA ALBICANS -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:**
 - RASPADO OU SWAB DE LESÃO CUTÂNEA OU MUCOSA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SWAB VAGINAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:**
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- 

OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);
- 
 - FEZES FRESCAS (EM AVES) (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);
- 
 - URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);
- 
 - FRAGMENTO DE TECIDO: TECIDO ORAL, TECIDO LINGUAL, ESÔFAGO, PAPO, INTESTINO, FÍGADO, PULMÃO, TECIDO GENITAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

VCANDI

CANDIDA SPP. - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:**
 - RASPADO OU SWAB DE LESÃO CUTÂNEA OU MUCOSA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SWAB VAGINAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:**
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- 

OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);
- 
 - FEZES FRESCAS (EM AVES) (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);
- 
 - URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);
- 
 - FRAGMENTO DE TECIDO: TECIDO ORAL, TECIDO LINGUAL, ESÔFAGO, PAPO, INTESTINO, FÍGADO, PULMÃO, TECIDO GENITAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
CAPIL	CAPILLARIA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5G);  • SWAB CLOACAL (EM AVES E RÉPTEIS) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE TOTAL EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; GATOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; SUÍNO.
VCPNEU	CHLAMYDIA PNEUMONIAE - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	ANFÍBIOS; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; GRANDES FELINOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; RÉPTEIS; SUÍNOS.
VCTRA	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB URETRAL OU CERVICAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB CONJUNTIVAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	PRIMATAS
CLAMI	CHLAMYDOPHILA FELIS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G) (MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	GATOS; GRANDES FELINOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

CHPSI

CHLAMYDOPHILA
PSITTACI - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB COMBINADO OCULAR, OROFARÍNGEO E CLOACAL (EM AVES) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, TRAQUEIA, CONJUNTIVA, CLOACA, FÍGADO, BAÇO, INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
CÃES;
GATOS;
GRANDES FELINOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS.

CINOM

CINOMOSE CANINA
(CDV), VÍRUS DA - RT-q
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, CÉREBRO, BAÇO, LINFONODOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• MEDULA ÓSSEA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: RINS, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);

CÃES;
GRANDES FELINOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS.

VCIRC

CIRCOVÍRUS DOS
CANÁRIOS (CaCV) - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB COMBINADO OROFARÍNGEO E CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: TIMO, BURSA DE FABRÍCIUS, PELE, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET.
AVES SELVAGENS;

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

CIRPO

CIRCOVÍRUS DOS POMBOS (PiCV) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB COMBINADO OROFARÍNGEO E CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: TIMO, BURSA DE FABRÍCIUS, PELE, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
AVES SELVAGENS.

VCIRP

CIRCOVÍRUS DOS PSITACÍDEOS (PBFDV) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO);



• SWAB COMBINADO OROFARÍNGEO E CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



+ PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO);



+ SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB COMBINADO OROFARÍNGEO E CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: TIMO, BURSA DE FABRÍCIUS, PELE, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
AVES SELVAGENS.

VCGS

CITOMEGALOVÍRUS (CMV) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,3 ML);



• SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• LÍQUIDO AMNIÓTICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS, PULMÕES; BAÇO; CÉRVIX OU TECIDOS REPRODUTIVOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PRIMATAS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

CLOSBT

CLOSTRIDIUM
BOTULINUM - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS, PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• CONTEÚDO ESTOMACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
BOVINOS;
CÃES;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

CLOS1

CLOSTRIDIUM
ESTERTHETICUM - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS, PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB AMBIENTAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

BOVINOS;
SUÍNOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS.

CLOS2

CLOSTRIDIUM
GASIGENES - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• CONTEÚDO GASTROINTESTINAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• CONTEÚDO RUMINAL OU ESTOMACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
BOVINOS;
EQUINOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

VCPER

CLOSTRIDIUM
PERFRINGENS - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• CONTEÚDO GASTROINTESTINAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• CONTEÚDO RUMINAL OU ESTOMACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWABS DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
CLOSP	CLOSTRIDIUM SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • CONTEÚDO GASTROINTESTINAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • CONTEÚDO RUMINAL OU ESTOMACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWABS DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO AVES PET AVES SELVAGENS BOVINOS CAPRINOS E OVINOS EQUINOS PEQUENOS MAMÍFEROS PRIMATAS RÉPTEIS SUÍNOS
CCE	CORONAVÍRUS CANINO (CCoV), VÍRUS - RT-PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO DELGADO (JEJUNO E ÍLEO), MESENTÉRIO, LINFONODOS MESENTÉRICOS, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	CÃES
PIF	CORONAVÍRUS FELINO (FCoV), VÍRUS - RT-PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 g);  • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS, LINFONODOS MESENTÉRICOS, MESENTÉRIO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	GATOS GRANDES FELINOS
CRYCC	CRYPTOCOCCUS SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • RASPADO OU SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS, PULMÃO OU NÓDULOS PULMONARES, LINFONODOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; GRANDES FELINOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; RÉPTEIS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
CPARV	CRYPTOSPORIDIUM PARVUM - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; GRANDES FELINOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; RÉPTEIS; SUÍNOS.
CSERP	CRYPTOSPORIDIUM SERPENTIS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS, ESTÔMAGO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	RÉPTEIS (Ofídios)
VCRYP	CRYPTOSPORIDIUM SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS, ESTÔMAGO OU MESENTÉRIO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS GATOS; GRANDES FELINOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; RÉPTEIS; SUÍNOS.
ISOBE	CYSTOISOSPORA BELLI - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETA OU CLOCAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	PRIMATAS
VCYT	CYTAUXZOOM SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO, RINS, PULMÃO, LINFONODO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML).	GATOS GRANDES FELINOS

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

DIRO	DIROFILARIA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • PLASMA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO E CORAÇÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LÍQUIDO CAVITÁRIO (PLEURAL OU PERITONEAL) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	CÃES; GATOS; GRANDES FELINOS; PEQUENOS MAMÍFEROS.
------	--	---	--

EHCA	EHRlichia canis - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO, RINS, PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML);  • LÍQUIDO SINOVIAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,3 ML).	CÃES
------	---	---	------

EHSP	EHRlichia spp. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO, RINS, PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML);  • LÍQUIDO SINOVIAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,3 ML).	BOVINOS; CÃES; EQUINOS; GATOS; GRANDES FELINOS; PRIMATAS.
------	--	---	--

VEIME	EIMERIA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB DE CLOACA OU CECO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; BOVINOS; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; SUÍNOS.
-------	--	---	---

TEIMER	EIMERIA SPP., GENOTIPAGEM – PCR EIMERIA ACERVULINA; EIMERIA MAXIMA; EIMERIA TENELLA; EIMERIA MITIS; EIMERIA NECATRIX; EIMERIA BRUNETTI PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB DE CLOACA OU CECO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; BOVINOS; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; SUÍNOS.
--------	---	---	---

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
VEBUN	ENCEPHALITOZON CUNICULI - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS, CÉREBRO, BAÇO, LINFONODOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	CÃES; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; (COELHOS).
ENTAMO	ENTAMOEBA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G). • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SWAB RETAL OU SWAB DE CLOACA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).  •	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; GATOS; PRIMATAS; RÉPTEIS; SUÍNOS.
ENTER	ENTEROCOCCUS SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SWAB OROFARÍNGEO OU SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  •  •	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; SUÍNOS.
VETRS	ENTEROVÍRUS SPP. - RT-PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G); • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS); • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML); • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS, BAÇO, CÉREBRO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  •  •  •  •	BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; SUÍNOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

ECOLI

ESCHERICHIA COLI - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB AMBIENTAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

TECOLA

ESCHERICHIA COLI
ENTEROINVASIVA - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• CULTURA BACTERIANA PARA IDENTIFICAÇÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

ECOEP

ESCHERICHIA COLI
ENTEROPATOGÊNICA - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• CULTURA BACTERIANA PARA IDENTIFICAÇÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

ECO157

ESCHERICHIA COLI
O157:H7- PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• CULTURA BACTERIANA PARA IDENTIFICAÇÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
GLPCR	GIARDIA LAMBLIA - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; RÉPTEIS; SUÍNOS.
DIBPCR	GUMBORO (BIRNAVÍRUS - IBDV), VÍRUS - RTPCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: BURSA DE FABRICIUS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO
HELIP	HELICOBACTER PYLORI - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: ESTÔMAGO (MUCOSA GÁSTRICA) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • BIÓPSIA GÁSTRICA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	CÃES; GATOS; GRANDES FELINOS.
VHESP	HELICOBACTER SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: ESTÔMAGO (MUCOSA GÁSTRICA) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • BIÓPSIA GÁSTRICA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	CÃES GATOS GRANDES FELINOS PRIMATAS SUÍNOS
VHEPAB	HEPATITE B (HBV), VÍRUS - qPCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • PLASMA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LÍQUIDO CAVITÁRIO (PLEURAL OU PERITONEAL) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	PRIMATAS

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
VHEPAC	HEPATITE C (HCV), VÍRUS - RT-q PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • PLASMA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LÍQUIDO CAVITÁRIO (PLEURAL OU PERITONEAL) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	PRIMATAS
VHSX12	HERPES SIMPLEX 1 E 2 (HSV-1 / HSV-2), VÍRUS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB DE LESÃO CUTÂNEA OU MUCOSA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,3 ML).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: CÉREBRO, FÍGADO, PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	PRIMATAS
HERPC	HERPESVÍRUS CANINO TIPO 1 (CHV-1), VÍRUS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB DE LESÃO GENITAL OU NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, FÍGADO, RINS, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • LÍQUIDO AMNIÓTICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	CÃES
HERPO	HERPESVÍRUS DE COLUMBÍDEOS TIPO 1 (CoHV-1), VÍRUS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO, PULMÃO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • SWAB DE CONJUNTIVA OU NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES PET; AVES SELVAGENS

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
MAREK	HERPESVÍRUS DE MAREK (HVT) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO, NERVOS PERIFÉRICOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS.
PACHE	HERPESVÍRUS DE PACHECO 1 E 2 (PSHV-1 / PSHV-2), VÍRUS - PCR QUALITATIVO ESTE TESTE DETECTA, MAS NÃO DIFERENCIA: HERPESVÍRUS DE PACHECO TIPO 1, GENÓTIPOS 1, 2, 3 E 4 (SOROTIPOS 1, 2, 3 E 4) E HERPESVÍRUS DE PACHECO TIPO 2 PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO, PULMÃO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB COMBINADO OROFARÍNGEO E CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS)  • +SWAB DE CONJUNTIVA OU NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES PET; AVES SELVAGENS.
HERFE	HERPESVÍRUS FELINO TIPO 1 (FHV-1), VÍRUS - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB DE CONJUNTIVA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, FÍGADO, RINS, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: PLACENTA E FETOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LÍQUIDO AMNIÓTICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)  • + SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	GATOS; GRANDES FELINOS.
HEX	HEXAMITA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES PET ; AVES SELVAGENS; PEIXES DE AQUÁRIO; RÉPTEIS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

HISTO

HISTOMONAS SPP. - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FRAGMENTOS DE TECIDO:
FÍGADO E CECO (COLETOR
UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN
OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL,
MÍNIMO 5 G).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB DE CLOACA (COLETOR
UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

VHICA

HISTOPLASMA
CAPSULATUM - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FRAGMENTOS DE TECIDO:
PULMÃO, FÍGADO, BAÇO,
LINFONODOS (COLETOR
UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO
(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN
OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL,
MÍNIMO 5 G);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA
(TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA
(MÍNIMO 3 GOTAS);



• LÍQUIDO CAVITÁRIO (COLETOR
UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5
ML).

AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

FIV

IMUNODEFICIÊNCIA
VIRAL FELINA (FIV), DNA
PROVIRAL - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA
(TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA
(MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB ORAL (COLETOR
UNIVERSAL ESTÉRIL).

GATOS;
GRANDES FELINOS.

VINFLU

INFLUENZA A, VÍRUS -
RT-qPCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO
(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB NASOFARÍNGEO (COLETOR
UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• LAVADO BRÔNCOALVEOL AR
(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL,
MÍNIMO 0,5 ML);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA
(TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA
(MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTOS DE TECIDO
PULMONAR (COLETOR UNIVERSAL
ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES FELINOS;
PRIMATAS;
SUÍNOS.

VISOS

ISOSPORA SPP. - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN
OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL,
MÍNIMO 5 G);



• SWAB RETAL OU CLOACAL
(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• FRAGMENTOS DE TECIDO:
INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL
ESTÉRIL).

CÃES;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS SUÍNOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

VLAW

LAWSONIA
INTRACELLULARIS - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



- SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS GRANDES;
MAMÍFEROS PEQUENOS;
MAMÍFEROS PRIMATAS.

VLEPCR

LEISHMANIA SPP. -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: LINFONODOS, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- MEDULA ÓSSEA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- RASPADO DE LESÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS.

LEPT

LEPTOSPIRA SPP.
PATOGENICA - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- URINA(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- FRAGMENTOS TECIDO PARA CASOS REPRODUTIVOS : PLACENTA, ÚTERO, FETO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- LÍQUIDO AMNIÓTICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SECREÇÕES VAGINAIS OU SEMINAIS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
SUÍNOS.

FELV

LEUCEMIA VIRAL FELINA
(FELV), DNA PROVIRAL -
PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- MEDULA ÓSSEA EM TUBO EDTA TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML);



- URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



- LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).

GATOS;
GRANDES FELINOS.

LEUMI

LEUCOSE MIELÓIDE
AVIÁRIA, VÍRUS DA
(ALV-J) - PCR RFLP

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
LEUSAR	LEUCOSE SARCOMA, VÍRUS DA (ALV-A, ALV-B, ALV-C, ALV-D, ALV-J) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: LINFONODOS, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS.
LMON	LISTERIA MONOCYTOGENES - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: CÉREBRO, FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTOS DE PLACENTA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: RINS, PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB DE LESÃO OU AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SECREÇÃO VAGINAL OU UTERINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PEIXES DE CULTIVO; PRIMATAS; RÉPTEIS.
VMEGA	MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (MEGABACTERIA) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB DE CLOACA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: VENTRÍCULO, PRÓ- VENTRÍCULO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, ESTÔMAGO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB DE LESÃO GASTROINTESTINAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	GATOS; GRANDES FELINOS.
MYCOB	MYCOBACTERIUM AVIUM - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO, FÍGADO, GÔNADAS, PELE, SACOS AÉREOS (AVES) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • ASPIRADO DE LINFONODO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • MEDULA ÓSSEA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML).  - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES);  • SWAB RETAL/ CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MATERIAL ORGÂNICO VISÍVEL);  • LAVADO GÁSTRICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; SUÍNOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

MGEN

MYCOBACTERIUM
GENAVENSE - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - ASPIRADO DE LINFONODO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 - LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO, FÍGADO, SACOS AÉREOS (AVES) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 - MEDULA ÓSSEA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML);
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
 -  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES);
 -  • SWAB RETAL/ CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MATERIAL ORGÂNICO VISÍVEL);
 -  • LAVADO GÁSTRICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
AVES SELVAGENS;
CÃES;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS.

VMYIN

MYCOBACTERIUM
INTRACELLULARE - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - ASPIRADO DE LINFONODO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 - LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO, FÍGADO, SACOS AÉREOS (AVES) (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 - MEDULA ÓSSEA EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML);
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
 -  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES);
 -  • SWAB RETAL/ CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MATERIAL ORGÂNICO VISÍVEL);
 -  • LAVADO GÁSTRICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS SUÍNOS.

MYCSP

MYCOBACTERIUM SPP. -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
 -  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);
 - ASPIRADO DE LINFONODO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 -  • SWAB RETAL/ CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MATERIAL ORGÂNICO VISÍVEL);
 -  • FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES);
 -  • FRAGMENTOS DE TECIDO: PELE, SACOS AÉREOS (AVES), MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML).

ANFÍBIOS;
AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES FELINOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEIXES DE AQUÁRIO;
PEIXES DE CULTIVO;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

VMYTU

MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS
(COMPLEXO MCT) - PCR
QUALITATIVO

ESTE TESTE DETECTA, MAS
NÃO DIFERENCIA
MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS, M. BOVIS, M.
AFRICANUM, M. CANETTII, M.
MICROTI E M. PINNIPEDII

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- 
 - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);
- 
 - ESPUTO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - ASPIRADO DE LINFONODO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);
- 
 - SWAB DE LESÕES CUTÂNEAS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES).

AVES PET;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES FELINOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
SUÍNOS.

MGPCR

MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM (MG) - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- 
 - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);
- 
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, SACOS AÉREOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE
PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES
SELVAGENS.

HAEMOC

MYCOPLASMA
HAEMOCANIS - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- 
 - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML);
- 
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
GATOS;
GRANDES
FELINOS.

HEFEL

MYCOPLASMA
HAEMOFELIS - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML).
- 
 - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

GATOS;
GRANDES
FELINOS.

MIOW

MYCOPLASMA IOWAE
(MI) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS

- 
 - AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)
- 
 - OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).
- 
 - AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, SACOS AÉREOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - OVÁRIOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- 
 - LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).

AVES DE
PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES
SELVAGENS.



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

MYP

MYCOPLASMA PNEUMONIAE (MP) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SWAB NASOFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- ESPUTO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- LAVADO BRONCOALVEOL AR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).

AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)

OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

PRIMATAS

MYCO

MYCOPLASMA SPP. - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)

OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);

- SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SWAB CUTÂNEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- FRAGMENTO DE PELE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);
- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SWAB NASOFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- LAVADO BRONCOALVEOL AR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).

ANFÍBIOS;
AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES FELINOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEIXES DE AQUÁRIO;
PEIXES DE CULTIVO;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

MYCSY

MYCOPLASMA SYNOVIAE (MS) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)

OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).

AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);
- FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, SACOS AÉREOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- SWAB DE CONJUNTIVA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

MREL

MYCOPLASMA
MELEAGRIDIS (MM) -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



- AMOSTRAS PRIMÁRIAS:**
- SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
 - SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



- OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



- AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:**
- FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, SACOS AÉREOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- OVÁRIOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);
- LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

VNEO

NEOSPORA CANINUM -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



- AMOSTRAS PRIMÁRIAS:**
- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML);



- LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: CÉREBRO, FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- PLACENTA FRESCA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



- AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:**
- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



- FLUIDO AMNIÓTICO OU ABORTIVO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
BOVINOS;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
SUÍNOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;

SNEO

NEOSPORA SPP. - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



- AMOSTRAS PRIMÁRIAS:**
- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



- OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: CÉREBRO, FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- PLACENTA FRESCA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



- AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:**
- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



- FLUIDO AMNIÓTICO OU ABORTIVO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
BOVINOS;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
SUÍNOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS.

VNEW

NEWCASTLE (NDV),
VÍRUS DA DOENÇA DE -
RT-PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



- AMOSTRAS PRIMÁRIAS:**
- SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



- OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



- AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:**
- LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)



- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

VORNI

ORNITHOBACTERIU M
RHINOTRACHEALE (ORT)
- PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, SACOS AÉREOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

VPARS

PAPILOMAVÍRUS SPP.
(PV) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB DE LESÃO CUTÂNEA OU MUCOSA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FRAGMENTO DE TECIDO: PELE, MUCOSA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB DE CAVIDADE ORAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB DE LESÃO GENITAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES FELINOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS.

VBLAST

PARACOCCIDIOIDES
BRASILIENSIS - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• RASPADO DE LESÃO CUTÂNEA OU MUCOSA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• LAVADO BRONCOALVEOL AR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: LINFONODOS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

VPAROF

PARAMYXOVÍRUS
OFÍDICO - RT-PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL) ;



• FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FRAGMENTOS DE ÓRGÃOS (PULMÃO, SACOS AÉREOS (AVES), BAÇO, FÍGADO, INTESTINO).

RÉPTEIS

VPARAM

PARAMYXOVÍRUS SPP.
(PMV) - RT-PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• SWAB NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
CÃES;
GATOS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS.

PARV

PARVOVÍRUS CANINO 2
(CPV-2) - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

PARVF	PARVOVÍRUS FELINO (FPV/ PANLEUCOPENIA FELINA) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SWAB DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL). 	GATOS; GRANDES FELINOS; PEQUENOS MAMÍFEROS.
PASQL	PASTEURELLA MULTOCIDA - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; SUÍNOS.
PLASM	PLASMODIUM SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS). 	ANFÍBIOS; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; GRANDES FELINOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; RÉPTEIS.
PLES	PLESIOMONAS SHIGELLOIDES - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML) • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS); • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL); • ÁGUA – ESPECIALMENTE EM CASOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL (AMOSTRAS DE RIOS, LAGOS OU SISTEMAS DE ÁGUA).  	CÃES; GATOS; PEIXES DE AQUÁRIO; PEIXES DE CULTIVO; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; RÉPTEIS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

VPCAR

PNEUMOCYSTIS CARINII (PC) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



- LAVADO BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



- SWAB TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SWAB NASOFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



- AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: PULMÃO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

CÃES;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
SUÍNOS.

POLI

POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



- AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- PENAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 6 PENAS COM BULBO).



- AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
AVES SELVAGENS.

PSEA

PSEUDOMONAS AERUGINOSA - PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



- AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).



- AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - LAVADO TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML)



- SWAB NASAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).

ANFÍBIOS;
AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
SUÍNOS.

REOPCR

REOVÍRUS AVIÁRIO (ARV) - RT-PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



- AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
 - SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



- AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
 - SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO, PULMÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

VRICT

RICKETTSIA RICKETTSII -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,3 ML).

CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
GRANDES MAMÍFEROS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS.

ROTA

ROTAVÍRUS A (RV-A) -
RT-PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
SUÍNOS.

TIFO

SALMONELLA
GALLINARUM - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

PULOR

SALMONELLA
PULLORUM - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



- SWAB CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS.

SALMO

SALMONELLA SPP. - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:

- FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



- SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



- OVOS (SWAB DA CASCA OU DO CONTEÚDO)



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:

- SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



- FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

ANFÍBIOS;
AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS.



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

TIPHI	SALMONELLA TYPHIMURIUM - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	ANFÍBIOS; AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; SUÍNOS.
-------	--	---	--

IGSP	SALMONELLA, TIPIFICAÇÃO PNSA – GENOTIPAGEM SALMONELLA GALLINARUM; S. PULLORUM; S. ENTERITIDIS; S. TYPHIMURIUM PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (5 G, KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • OVOS (SWAB DA CASCA OU DO CONTEÚDO).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • CULTURA BACTERIANA PARA IDENTIFICAÇÃO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	
------	--	---	--

SARC	SARCOCYSTIS SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FRAGMENTO DE TECIDO: MÚSCULO, CÉREBRO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTO DE TECIDO: FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • LÍQUOR (COLETO UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	BOVINOS; CÃES; EQUINOS; GATOS; OVINOS; PRIMATAS; RÉPTEIS; SUÍNOS.
------	--	---	--

COVID	SARS-CoV-2 (COVID-19) - RT- qPCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB NASAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • LAVADO FARÍNGEO OU TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML).	CÃES; GATOS; GRANDES FELINOS; PRIMATAS; PEQUENOS MAMÍFEROS; GRANDES MAMÍFEROS.
-------	--	---	---

SHIG	SHIGELLA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEM OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTO DE TECIDO: INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  • SWAB DE LESÕES INTESTINAIS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  • SWABS DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	PRIMATAS
------	---	---	----------



CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

STAU

STAPHYLOCOCCUS
AUREUS - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• RASPADO OU SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB DE NARINAS O TRAQUEAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB DE BOCA OU CLOAC (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SECREÇÃO PURULENTA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDT (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• URINA (COLETO UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• SWAB DE AMBIENTE (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• FRAGMENTO DE TECIDOS: FÍGADO, RINS, PULMÕES (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
PEIXES DE AQUÁRIO;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

STRGA

STREPTOCOCCUS
GALLOLYTICUS - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• FRAGMENTOS DE TECIDOS: FÍGADO, PULMÕES BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SECREÇÃO PURULENTA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB DE LESÕES CUTÂNEAS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)



• LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
SUÍNOS.

STRSP

STREPTOCOCCUS SPP. -
PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);



• SECREÇÃO PURULENTA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);



• SWAB DE NARINAS OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);



• LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• URINA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);



• FRAGMENTO DE TECIDOS: FÍGADO, PULMÕES, RINS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES DE PRODUÇÃO;
AVES PET;
AVES SELVAGENS;
BOVINOS;
CÃES;
CAPRINOS E OVINOS;
EQUINOS;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
PRIMATAS;
RÉPTEIS;
SUÍNOS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
THEIL	THEILERIA SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTO DE LINFONODO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • RASPADO OU SWAB DE LESÃO CUTÂNEA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • MEDULA ÓSSEA EM EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,3 ML).	BOVINOS CAPRINOS E OVINOS EQUINOS SUÍNOS RÉPTEIS
TOXO	TOXOPLASMA GONDII (TG) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • LÍQUIDO AMNIÓTICO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LÍQUOR (COLETO UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • FRAGMENTO DE TECIDO CEREBRAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • OLHO (AQUOSO OU VÍTREO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTO DE TECIDOS: FÍGADO, PULMÃO, PLACENTA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB RETAL (COLETO UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GATOS; HUMANOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; SUÍNOS.
TRICGA	TRICHOMONAS GALLINAE - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB DE LESÕES CUTÂNEAS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS.
VTRICH	TRICHOMONAS SPP. - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LAVADO TRAQUEAL OU OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SWAB DE CAVIDADE BUCAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO, BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETAL OU CLOACAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML).	ANFÍBIOS; AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; CÃES; GATOS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; RÉPTEIS.

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
TRYP	TRYPANOSOMA CRUZI (TC) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO (BAÇO, FÍGADO, COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • TRIATOMÍNEOS INTEIROS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G).	CÃES; GATOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS; SUÍNOS.
TRYEV	TRYPANOSOMA EVANSI (TE) - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: BAÇO, FÍGADO, (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • LÍQUOR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).	BOVINOS; CÃES; CAPRINOS E OVINOS; EQUINOS; GRANDES FELINOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; SUÍNOS.
VMYAV	TUBERCULOSE AVIÁRIA (COMPLEXO M. AVIUM) - PCR QUALITATIVO MYCOBACTERIUM AVIUM; M. INTRACELLULARE PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • LAVADO TRAQUEAL OU BRONCOALVEOLAR (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 0,5 ML);  • SWAB OROFARÍNGEO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • FRAGMENTOS DE TECIDO: FÍGADO OU BAÇO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETAL ou CLOACA (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL);  • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS).	AVES DE PRODUÇÃO; AVES PET; AVES SELVAGENS; BOVINOS; SUÍNOS; CÃES; GATOS; GRANDES MAMÍFEROS; PEQUENOS MAMÍFEROS; PRIMATAS.
VICHO	VIBRIO CHOLERAЕ - PCR QUALITATIVO PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS	 • AMOSTRAS PRIMÁRIAS: • FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 5 G);  • SWAB RETAL (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).  • AMOSTRAS SECUNDÁRIAS: • SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA (TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)  • OU SANGUE EM PAPEL FTA (MÍNIMO 3 GOTAS);  • FRAGMENTO DE INTESTINO (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL)  • ÁGUA AMOSTRADA EM ÁREAS SUSPEITAS (COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, MÍNIMO 50 ML).	PEIXES DE AQUÁRIO; PEIXES DE CULTIVO; GRANDES MAMÍFEROS; SUÍNOS; CÃES; GATOS; PRIMATAS;

CÓDIGO	ANÁLISE	AMOSTRA	ESPÉCIE
--------	---------	---------	---------

YERENT

YERSINIA
ENTEROCOLITICA - PCR
QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN
OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL,
MÍNIMO 5 G);



• SWAB RETAL OU CLOACAL
(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA
(TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA
(MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTO DE INTESTINO
(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
AVES SELVAGENS;
AVES DE PRODUÇÃO;
BOVINOS;
CÃES;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
SUÍNOS;
PRIMATAS.

YERS

YERSINIA
PSEUDOTUBERCULOSIS
- PCR QUALITATIVO

PRAZO: 3 DIAS ÚTEIS



AMOSTRAS PRIMÁRIAS:
• FEZES FRESCAS (KIT AMPLIGEN
OU COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL,
MÍNIMO 5 G);



• SWAB RETAL OU CLOACA
(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).



AMOSTRAS SECUNDÁRIAS:
• SANGUE TOTAL EM TUBO EDTA
(TAMPA ROXA, MÍNIMO 0,5 ML)



OU SANGUE EM PAPEL FTA
(MÍNIMO 3 GOTAS);



• FRAGMENTO DE INTESTINO
(COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL).

AVES PET;
AVES SELVAGENS;
AVES DE PRODUÇÃO;
BOVINOS;
CÃES;
GATOS;
PEQUENOS MAMÍFEROS;
SUÍNOS;
PRIMATAS.

Serviços

CÓDIGO

SERVIÇO

PREÇO

EXTD

EXTRAÇÃO DE DNA

Amostra: Diversas matrizes (consultar laboratório).

Prazo: Variável (de acordo com volume de amostras).

SOB CONSULTA

EXTR

EXTRAÇÃO DE RNA

Amostra: Diversas matrizes (consultar laboratório).

Prazo: Variável (de acordo com volume de amostras).

SOB CONSULTA

PESQ

PESQUISA CIENTÍFICA PERSONALIZADA

Amostra: Diversas matrizes (consultar laboratório).

Prazo: Variável (de acordo com o volume de amostras e metodologia aplicada).

SOB CONSULTA

SEQC

SEQUENCIAMENTO DE FRAGMENTOS DE DNA

Amostra: Diversas marcações (consultar laboratório).

Prazo: Variável (de acordo com a região de análise).

SOB CONSULTA

Envio de amostras

Para garantir a qualidade dos exames laboratoriais, é fundamental que as amostras sejam enviadas de forma adequada, respeitando os dias e horários recomendados para evitar que fiquem paradas durante o transporte. Siga as orientações abaixo para o envio correto e seguro das amostras ao laboratório Ampligen Biotecnologia.

Dias de Envio Recomendados:

- As amostras devem ser enviadas de **segunda a quinta-feira**.
- **Evitar envios na sexta-feira ou em vésperas de feriados**, pois as amostras podem ficar paradas durante o transporte, comprometendo sua integridade.

Embalagens e Acondicionamento:

- A amostra deve ser colocada em um **recipiente primário** (frasco estéril ou tubo), devidamente selado e vedado.
- Utilize uma **embalagem secundária impermeável**, como sacos de transporte com fecho hermético, para evitar qualquer risco de contaminação ou vazamento.
- Para transporte de longa distância ou amostras que requerem controle de temperatura, utilize uma **embalagem terciária rígida** e isotérmica para garantir a integridade da amostra durante o trajeto. Esse procedimento está em conformidade com a **RDC 20/2014** da Anvisa.

Tempo Máximo para o Envio:

- As amostras devem ser enviadas para o laboratório o mais rápido possível, de preferência no mesmo dia da coleta.
- Amostras refrigeradas podem ser enviadas em até **24 horas** após a coleta, enquanto amostras congeladas devem ser enviadas imediatamente.

Identificação das Amostras:

Todas as amostras devem ser corretamente identificadas com:

- Nome do paciente (animal);
- Espécie;
- Data e hora da coleta;
- Tipo de exame solicitado;
- Use etiquetas legíveis e resistentes à umidade;
- Ao enviar o pedido médico veterinário, certifique-se de acondicioná-lo em um saco plástico resistente para proteger o documento contra umidade durante o transporte.

Endereço para Envio de Amostras

As amostras devem ser enviadas para o seguinte endereço:

Ampligen Biotecnologia - Laboratório
Av. Itororó, 405, Zona 2

Contato para Emergências ou Dúvidas:

(44) 3029-9660
suporte.tecnico@ampligen.com.br



Recomendações Importantes

Planejamento:

Sempre planeje o envio das amostras considerando o tempo de coleta e o transporte, evitando os períodos de sexta-feira e vésperas de feriados.

Acompanhamento:

Recomendamos que o envio seja feito por transportadora ou correios com serviço de rastreamento, permitindo o acompanhamento da entrega.

Notificação:

Após o envio, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico para notificar o despacho e confirmar o recebimento da amostra no laboratório.

Dúvidas sobre o Envio?

Caso tenha dúvidas sobre a forma correta de enviar as amostras ou sobre o transporte adequado para um exame específico, entre em contato com nossa equipe técnica através de:

Telefone/ WhatsApp:

(44) 3029-9660

E-mail:

suporte.tecnico@ampligen.com.br

Contato e Suporte

A **Ampligen Biotecnologia** está comprometida em oferecer suporte completo aos seus parceiros e clientes. Nossa equipe técnica está à disposição para esclarecer dúvidas, fornecer informações adicionais e garantir o acompanhamento necessário para os exames realizados.

Canais de Atendimento:

Telefone/WhatsApp:

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Suporte rápido e prático via WhatsApp.
Número: **(44) 3029-9660**

• E-mail:

Para dúvidas gerais ou acompanhamento de resultados:
suporte.tecnico@ampligen.com.br

• Suporte Online:

Acesse nosso Sistema de Laudos Online no site da Ampligen para acompanhar resultados e consultar histórico de exames:
www.ampligen.com.br

Suporte Técnico Especializado

Nossa equipe multidisciplinar é composta por médicos veterinários, biólogos, biomédicos e geneticistas, especialistas em biologia molecular e diagnóstico avançado.

Como podemos ajudar:

Acompanhamento de Resultados:

Orientações sobre interpretação de laudos e suporte no manejo das amostras.

Coleta de Amostras:

Dúvidas sobre coleta, acondicionamento e transporte.

Informações Técnicas:

Esclarecimentos sobre exames, metodologia (como PCR e sequenciamento genético), e dados sobre confiabilidade e limitações dos testes.

Apoio Diagnóstico:

Auxílio na escolha dos exames mais adequados, conforme o quadro clínico.



Nossa essência:

Estudar a Natureza, Estudar a vida.

Na Ampligen, a natureza é nossa maior inspiração. Estudar a natureza não é apenas nosso trabalho, mas nossa paixão. A cada exame, reafirmamos nosso compromisso com a vida dos animais.

A natureza, em sua complexidade e beleza, nos ensina a buscar soluções equilibradas e eficazes. Nossa missão vai além do diagnóstico: conectamos ciência e cuidado, oferecendo suporte a todos os profissionais comprometidos com a saúde animal.

A Grande Mãe: A Natureza

Assim como a natureza cria equilíbrio, buscamos respostas para restaurar a harmonia nos ciclos de vida dos animais. Cada espécie é única, cada exame é essencial, e cada resultado é uma oportunidade de fazer a diferença.

Estudar a Natureza. Essa é a Nossa Natureza.

Nosso objetivo é simples: melhorar a vida dos animais através da ciência. Trabalhamos em parceria com veterinários, biólogos e zootecnistas, baseando nossa colaboração na confiança e no respeito à vida.

Nosso Agradecimento

Obrigado por escolher a Ampligen como sua parceira em diagnósticos moleculares. É um privilégio contribuir com a sua jornada de cuidado e proteção aos animais. Juntos, continuaremos avançando, sempre em busca de novos conhecimentos e de um futuro melhor para todos os seres vivos.

A Natureza.
A grande mãe.
A natureza não faz nada em vão, como disse Aristóteles.
A natureza.
O nosso bem mais valioso.
Onde voltamos para nos conectar.
Reconectar. Reviver.
A natureza e as suas muitas belezas.
A beleza da flora.
A beleza da fauna.
A beleza da vida.
A natureza. Infinitos detalhes.
Todos perfeitos, cada um feito para a sua função.
No mais perfeito equilíbrio, compondo toda a sua imensidão.
Estudar a natureza.
Mais do que um trabalho.
Mais do que um privilégio.
Faz parte da nossa natureza.

Ampligen.
Estudar a **Natureza**.
Essa é a **nossa natureza**.

